



Nur mit diesem Siegel ist es ein Original!

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Zuchtvorbereitung, Vor- und Nachbereitung der Tauben für die Ausstellung

Nachdem in der Vergangenheit die Probleme in der Zucht und bei den Ausstellungstieren bei allen Sportsfreunden der Rassetauben sehr groß waren, wurde durch die Mitarbeit vieler Rassetaubenzüchter dieser Plan der Zuchtvorbereitung und der Vor- und Nachbereitung der Tauben bei einer Ausstellung entwickelt. Diese Empfehlungen haben sich bewährt – wir geben sie gerne weiter.

Zuchtvorbereitung

8 – 10 Tage vor der Anpaarung wird dem gesamten Bestand 3 Tage lang SoftAcid®IV+ E in flüssig oder Power Acid 4 + in Pulverform verabreicht. (flüssig über das Trinkwasser – Pulver über das Futter) Konzentration flüssig – 1 ml auf 1 Liter Wasser, Pulver – 1 TL mit Wasser zu einem Brei anrühren und unter 1 kg Futter mischen. Auch das Körnerfutter kann mit der flüssigen Konzentration angefeuchtet werden. Pilze und Sporen im Futter werden somit eliminiert. Das Futter wird dann mit Xentasan Pulver abgebunden. Danach wird dem täglichen Futter bis zur Eiablage stabilisierte Reiskleie untergemischt – 10 g mit Wasser zu einem Brei anrühren und unter 1 kg Körnerfutter mischen. Auch diese Mischung wird mit Xentasan Pulver abgebunden.

Befruchtungs- und Schlupfprobleme kennen diese Züchter nicht mehr. Nach dem Schlupf der Jungtiere erhalten die Eltern bis zum Absetzen täglich stabilisierte Reiskleie und Xentasan Pulver über das Körnerfutter, sowie 2 x wöchentlich SoftAcid®IV+ E flüssig oder Power Acid 4 + in Pulverform.

Vor- und Nachbereitung der Tauben für die Ausstellung

Das Futter wird 8 Tage vor der Ausstellung täglich mit Thülsfelder Mix angefeuchtet und mit Xentasan Pulver abgebunden. Der gesamte Bestand erhält SoftAcid®IV+ E flüssig, 1 ml auf 2 ltr. Wasser, oder Power Acid 4 + als Pulver, 1 TL mit Wasser als Brei angerührt und mit ca. 1,0 kg Futter vermischen, trocknen lassen oder auch mit Xentasan Pulver abbinden. Die Ausstellungstiere erhalten beim Einkorben SoftAcid®IV+ E flüssig 10 ml, in der Konzentration 1 ml auf 1 ltr. Wasser, direkt in den Kropf. Ebenfalls erhalten die Ausstellungstiere 1 Kapsel mit Xentasan Pulver in den Kropf.

Nach der Ausstellung wird sofort wieder die Kropfspülung in der Konzentration wie oben notiert, vorgenommen und das Wasser wird wieder mit SoftAcid®IV+ E flüssig für den gesamten Bestand angereichert bzw. mit Power Acid 4 + vermischt. Die Ausstellungstiere erhalten jetzt 1 Kapsel mit Colostrum Pulver.

Sollten Sie sich für diesen Plan entschieden haben, dürften Darmprobleme nicht mehr auftauchen und der Vergangenheit angehören.


Preise:

stabilisierte Reiskleie	500 g	9,80 €	Mineralith Pulver	500 g	7,50 €
Xentasan Pulver	500 g	13,60 €		1000 g	13,90 €
	1000 g	24,80 €	Mineralith Kapseln	150 Stck.	15,60 €
Xentasan Kapseln	150 Stck.	18,70 €			
Colostrum Pulver	250 g	33,00 €			
Colostrumkapseln	125 Stck.	24,20 €			

Bei einer Bestellung ab 30,00 € wird weder Fracht noch Porto erhoben.

Viel Erfolg wünscht Ihnen Franz Pöttker vom Teekontor aus Werlte.

Bockholter Weg 44 · 49757 Werlte · Telefon 0 59 51/99 05 05 · Fax 0 59 51/99 05 06
www.teekontor-werlte.de · e-mail: info@teekontor-werlte.de



Nur mit
diesem Siegel
ist es ein
Original!

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Wichtige Hinweise zur Verabreichung von SoftAcid®IV+ E in flüssig und PowerAcid 4+ Pulver bei starken Darmproblemen der Brief- und Rassejunge tauben (sog. Jungtaubenkrankheit)

1. Leichte und knappe Fütterung, am besten Diätfutter. Dieses Futter kann sehr stark mit einer Konzentration von **SoftAcid®IV+ E flüssig** angefeuchtet oder mit **Power Acid 4 + Pulver** angemischt werden. (flüssig - 1 ml auf 1 ltr. Wasser, Pulver 1 TL mit Wasser zu einem Brei mischen und unter 1 kg Futter rühren). Beide Mischungen mit Xentasan abbinden.
2. Das Wasser in der Tränke wird angereichert an den beiden ersten Tagen mit **SoftAcid®IV+ E** in flüssig in der Konzentration von 1 ml auf 1 ltr. Wasser, an den folgenden Tagen von 1,5 - 2 ml auf 1 ltr. Wasser.
3. Die Jungtauben sollten nicht trainiert werden, weder am Haus, noch bei einem Vor- oder Preisflug.
4. **PowerAcid 4+ Pulver**, 1 Esslöffel mit Wasser zu einem Brei verrühren, mit 1 kg Futter vermischen. Nicht mit einem anderen Produkt abbinden, sondern trocknen lassen und dann den Tauben füttern.
5. **PowerAcid 4+** darf in der Dose nicht mit Wasser in Berührung kommen.
6. **Wichtig bei der Verabreichung von SoftAcid®IV+ E flüssig.** SoftAcid®IV+ E flüssig in einer hochkonzentrierten Form entzieht dem Körper Mineralien. Feuchten Sie das Futter bei den ersten Anzeichen der Gesundung mit Thülsfelder Mix über das Diätfutter an und binden es mit Xentasan ab. Xentasan besteht zu ca. 66% aus Mineralith, ca. 20 % Bierhefe, ca. 10 % Saccharose, ca. 3 % pflanzlichen Fettsäuren und ca. 1% Vitamin D3.
7. Desinfizieren Sie täglich den Boden und vor allem die Sitzplätze nach vorheriger Reinigung mit **SoftAcid®IV+ E** in der Konzentration von 4 ml auf 1 Liter Wasser.
8. Sollten Sie dann noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte sofort an. Wir stehen Ihnen auf Grund unserer Erfahrungen immer zur Seite.

9. Jungtaubenkrankheit

Bei starkem Befall (Erbrechen, schleimiger Kot, usw.) empfehlen wir Ihnen, sofort Kontakt aufzunehmen mit der Taubenpraxis Am Weinberg André Pfützner unter der Telefonnummer: 0 35 37 - 20 23 25. Schnelle, unproblematische und kostengünstige Hilfe wird von Herrn Pfützner garantiert. Sollte er nicht anwesend sein, hinterlassen Sie die Tel.-Nr. und den Zeitpunkt, wann Sie am besten zu erreichen sind. Herr Pfützner ruft auf jeden Fall zurück.

Brieftauben

Gehen Sie davon aus, dass Jungtauben bei jedem Flug irgendein Problem mitbringen. Vor und nach jedem Flug muss das Immunsystem unterstützt werden. Sollten bereits die Darmprobleme vorüber sein, bekommen Sie keine Garantie, dass die Tauben in 4 Wochen nicht wieder davon befallen werden. Haben Sie keine Angst mehr vor diesen Problemen. Gehen Sie nach Plan vor und nehmen eventuell telefonisch Kontakt auf.